

## Насколько Вы зависимы?

Пройдите тест, созданный профессором клинической психологии Карлом Фаргес-тремом. Он позволит определить, насколько Вы зависимы, и подскажет, какие шаги необходимо предпринять, чтобы излечить себя от этой неприятной болезни.

Оценка степени никотиновой зависимости			Результаты
Вопрос	Ответ	Баллы	
Когда Вы тянетесь за сигаретой после пробуждения?	В первые 5 минут Через 6–30 минут Через 31–60 минут Через 1 час	3 2 1 0	<b>0–3 балла</b> Поздравляем, у Вас низкий уровень никотиновой зависимости. При прекращении курения основное внимание уделяйте психологическим факторам. Препараты замещения никотина Вам использовать необязательно.
Тяжело ли Вам воздержаться от курения в тех местах, где оно запрещено?	Да Нет	1 0	<b>4–5 баллов</b> У Вас средний уровень зависимости. Если Вы уже пробовали бросать курить самостоятельно и не справились с поставленной задачей, посоветуйтесь с врачом. Возможно, Вам имеет смысл использовать никотинзаместительные препараты для увеличения шансов на успех.
От какой сигареты Вы не можете легко отказаться?	От утренней От последующей	1 0	
Сколько сигарет Вы выкуриваете в день?	10 или менее 11–20 21–30 31 и более	0 1 2 3	<b>6–10 баллов</b> У Вас высокий уровень зависимости. Вам, наверняка, знакомы неприятные ощущения, возникающие при резком отказе от курения: головокружение, тошнота, голод, трудности с концентрацией внимания и сном, повышенная возбудимость. Возможно, Вы считаете, что с Вашим уровнем потребления табака избавляться от привычки уже поздно и даже вредно. Это не так. Вы должны приложить все усилия для того, чтобы бросить курить, и Ваш организм обязательно отблагодарит Вас. А справиться с неприятными ощущениями могут помочь никотинзаместительные препараты. И, конечно, перед их употреблением желательно проконсультироваться с врачом.
Когда Вы больше курите – утром или на протяжении дня?	Утром На протяжении дня	1 0	
Курите ли Вы во время болезни, когда Вы должны придерживаться постельного режима?	Да Нет	1 0	

Ваше решение должно сопровождаться обдумыванием и планированием жизни на ближайшее время. В первые месяцы после отказа от курения Вам лучше избегать ситуаций, ассоциирующихся с курением, или придумать психологическую замену сигарете.



Департамент  
здравоохранения  
Ханты-Мансийского  
автономного округа-Югры



**НИКОТИНОВАЯ  
ЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО БОЛЕЗНЬ**

## Как возникает никотиновая зависимость?

Никотин является алкалоидом растительного происхождения, так же как героин и кокаин. И так же как героин и кокаин, он вызывает развитие психологической и физической зависимостей, влияя на поведенческие реакции человека хоть и в меньшей степени, чем эти наркотики.

► Попадая в головной мозг, никотин взаимодействует с никотиновыми рецепторами, и в результате выделяется дофамин – вещество, которое оказывает положительное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему.

Довольно быстро в мозгу у курящего человека формируется рефлекс «покурил – получил удовольствие», который постепенно будет переходить в зависимость.

► У каждого курящего человека развивается болезнь – никотиновая зависимость.

**В больших дозах (60 мг) никотин вызывает паралич дыхательной и сердечно-сосудистой систем.**




## Синдром отмены

Самый явный признак зависимости от никотина – это появление так называемых симптомов отмены при прекращении курения. Чем сильнее зависимость, тем ярче они проявляются.

### ВОЗМОЖНЫЕ СИМПТОМЫ:

- непреодолимая тяга к курению;
- головная боль;
- недомогание, слабость;
- понижение кровяного давления
- раздражительность, фрустрация или агрессивность;
- повышенная тревожность;
- проблемы с концентрацией и удержанием внимания;
- двигательное беспокойство;
- нарушение сна, бессонница или, наоборот, сонливость;
- кашель;
- снижение скорости сердечных сокращений;
- повышение аппетита.



В большинстве случаев именно эти ощущения мешают отказаться от курения.

Появляются симптомы отмены уже через несколько часов после прекращения курения, максимально проявляются через 2-3 дня и делятся 3-4 недели. Курильщики, стремясь избавиться от них, возобновляют потребление табака.



Полностью никотиновая зависимость исчезает, если не курить 6 МЕСЯЦЕВ

## Психологическая зависимость

Кроме физической зависимости, проявляющейся через симптомы отмены, табакокурение вызывает зависимость психологическую.

► Психологическая зависимость складывается из привычных образов и действий, которые связаны в нашей памяти с курением:

- вождение автомобиля;
- обед, чашка кофе, рюмка коньяка;
- ожидание общественного транспорта или выход из метрополитена.

Многие курильщики употребляют сигареты только в этих ситуациях и спокойно обходятся без сигарет в другое время.



Теоретически они могут не курить вообще – их физическая зависимость слабо выражена.

► Постепенно число таких ситуаций накапливается и незаметно для курильщика развивается никотиновая зависимость.

## Ломка стереотипа поведения – один из сложнейших шагов в отказе от курения

Если в борьбе с физической зависимостью Вам могут помочь медикаментозные методы, то с психологической зависимостью придетсяправляться самостоятельно.